

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Pada bab ini peneliti akan membuat kesimpulan dan saran sebagai berikut.

1. Frekuensi persalinan dengan Ketuban Pecah Dini berdasarkan lamanya di Puskesmas Kecamatan Cilincing Periode Januari – Desember 2013 sebesar 16,47%
2. Distribusi Frekuensi persalinan dengan Ketuban Pecah Dini berdasarkan Usia Kehamilan Di Puskesmas Kecamatan Cilincing terbanyak yaitu pada kehamilan Aterm sebesar 71,4%
3. Distribusi Frekuensi persalinaan dengan Ketuban Pecah Dini berdasarkan paritas di Puskesmas Kecamatan Cilincing terbanyak yaitu primi gravida sebesar 50,0 %
4. Distribusi Frekuensi persalinan ketuban Pecah Dini berdasarkan pendidikan ibu di Puskesmas Kecamatan Cilincing yang terbanyak yaitu pada ibu yang berpendidikan SMP sebanyak 52,4%
5. Distribusi Frekuensi persalinan Ketuban Pecah Dini berdasarkan Usia ibu di Puskesmas Kecamatan Cilincing yang terbanyak yaitu pada ibu usia 20 – 35 tahun sebanyak 59,5%

7.2 Saran

Perlunya konseling dan promosi kesehatan pada seluruh ibu hamil terutama yang akan memasuki masa persalinan, terhadap resiko ketuban pecah dini, sehingga ibu hamil dianjurkan untuk berperilaku hidup sehat yang bermanfaat bagi kesehatannya baik kesehatan fisik maupun reproduksinya.