

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap 44 orang yang terinfeksi HIV/AIDS di Puskesmas Kecamatan Gambir Jakarta Pusat didapatkan hasil sebaagi berikut :

7.1.1 Analisis Univariat

7.1.1.1 Frekuensi kejadian HIV/AIDS terbanyak pada usia reproduktif sebesar 84,1%.

7.1.1.2 Distribusi frekuensi HIV/AIDS berdasarkan jenis kelamin bermayoritas laki-laki sebesar 75%.

7.1.1.3 Distribusi frekuensi HIV/AIDS berdasarkan pendidikan didapatkan bahwa paling banyak pada jenjang SMA sebesar 34,1%.

7.1.1.4 Distribusi frekuensi HIV/AIDS berdasarkan pekerjaan didapatkan bahwa mayoritas HIV/AIDS tidak mempunyai pekerjaan sebesar 56,8%.

7.1.2 Analisis Bivariat

7.1.2.1 Hasil uji statistik diperoleh nilai $P = 0,032$ maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara HIV/AIDS pada usia reproduktif dengan Jenis Kelamin.

7.1.2.2 Hasil uji statistik diperoleh nilai $P = 0,840$ maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara HIV/AIDS pada usia reproduktif dengan Pendidikan.

7.1.2.3 Hasil uji statistik diperoleh nilai $P = 0,531$ maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara HIV/AIDS pada usia reproduktif dengan Pekerjaan.

7.2 Saran

Dari kesimpulan penelitian ini diatas, maka saran peneliti untuk penderita HIV/AIDS khususnya pada usia reproduktif sendiri ialah agar mengajak teman atau rekannya yang sesama penderita HIV/AIDS untuk mengikuti program ARV (Anti Retroviral) untuk memperlambat perkembangan virus ke tahap AIDS di tempat pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan ini, mengikuti penyuluhan dan mengajak teman atau keluarga, mengikuti kegiatan positif .untuk petugas kesehatan yang berada pada sarana pelayanan di puskesmas kecamatan gambir khususnya di bagian HIV/AIDS agar lebih menambah pengetahuan pasien dengan sering mengadakan penyuluhan yang aktif disertai dengan pembagian alat kontrasepsi sederhana untuk pencegahan penularan HIV/AIDS.